

凡 例

收穫、出荷



整枝、剪定



茶（三多摩地域）
栽培型

作型名	1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10月		11月		12月	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
成木園 (定植後7年以上)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%; text-align: center;">■ 整枝</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">— 一番茶摘取</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">— 2番茶摘取</div> <div style="width: 20%;"></div> </div>																							
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">防寒 →</div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%; text-align: center;">← 防寒</div> </div>																							
基準収量：1番茶400kg 2番茶300kg やぶきた																								

対象土壌と施肥基準 (kg / 10 a)

土壌	黒 ぼ く 土				
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	たい肥
施 肥 基 準	春肥1	14	8	8	2000
	春肥2	11			
	夏肥	10	5	5	
	秋肥	10	8	8	
	計	45	21	21	

年次	1	2	3	4	5	6
成木園に対する割合 (%)	20	40	60	70	90	100

施肥上の留意

基肥とともに苦土石灰を10aあたり100～200kg施す。
 二番茶の収穫を行わない場合には、樹勢をみながら、夏肥を減量する。
 施用成分の30%以上を有機質肥料とする。